

Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire

Version consolidée au 07 janvier 2016

Article 1

- ▶ Modifié par Arrêté du 31 août 1995 - art. 2

Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

Article 2

- ▶ Modifié par Arrêté 1995-08-31 art. 1 JORF 17 octobre 1995

Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l'annexe II du présent arrêté.

Article 3

- ▶ Modifié par Arrêté du 31 août 1995 - art. 3

Pour les spécimens sauvages poussant sur le territoire national des espèces citées à l'annexe II, le ramassage ou la récolte, l'utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou onéreux sont soumis à autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après avis du comité permanent du conseil national de la protection de la nature.

Cette autorisation doit être présentée à toute requête des agents mentionnés à l'article L. 215-5 du code rural.

Les formulaires de demande d'autorisation de récolte (référence C. E. R. F. A. n° 07-0354) sont disponibles auprès du ministère chargé de la protection de la nature (direction de la nature et des paysages, sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore sauvages).

Article 4

- ▶ Modifié par Arrêté 1995-08-31 art. 1 JORF 17 octobre 1995

Chaque demande d'autorisation de récolte devra porter sur une seule espèce et préciser :

Le nom scientifique et éventuellement le nom vernaculaire ;

Les parties de la plante récoltée (graines, feuilles, bulbes, plante entière, etc.) ;

La quantité prévue (nombre ou poids) ;

Le lieu de la récolte (département, commune) ;

L'époque de la récolte (date et durées prévues) ;

Le nom du demandeur ;

Le nom de la personne chargée de la récolte ;

Le mode, la durée et les conditions de transport ;

La destination de la récolte.

Article 5

- ▶ Modifié par Arrêté 1995-08-31 art. 1 JORF 17 octobre 1995

Le directeur de la protection de la nature, le directeur de la qualité, le directeur de la pharmacie et du médicament, les préfets et les maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

► Annexes

Annexe I

► Modifié par Arrêté du 23 mai 2013 - art. 1

Dicotylédones	
<i>Aconitum corsicum</i> Gayer.	Aconit de Corse.
<i>Adonis pyrenaica</i> DC.	Adonis des Pyrénées.
<i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.	Aldrovanda.
<i>Alyssum arenarium</i> Loisel.	Corbeille d'or des sables.
<i>Alyssum corsicum</i> Duby.	Corbeille d'or de Corse.
<i>Anagallis crassifolia</i> Thore.	Mouron à feuilles charnues.
<i>Anchusa crispa</i> Viv.	Buglosse crépu.
<i>Andromeda polifolia</i> L.	Andromède.
<i>Androsace alpina</i> (L.) Lam.	Androsace des Alpes.
<i>Androsace chamaejasme</i> Wulfen.	Androsace petit-jasmin.
<i>Androsace cylindrica</i> DC.	Androsace cylindrique.
<i>Androsace helvetica</i> (L.) All.	Androsace de Suisse.
<i>Androsace pubescens</i> DC.	Androsace pubescente.
<i>Androsace pyrenaica</i> Lam.	Androsace des Pyrénées.
<i>Androsace vandellii</i> (Turra) Chiov.	Androsace de Vandelli.
<i>Anémone coronaria</i> L.	Anémone couronnée.
<i>Anémone palmata</i> L.	Anémone palmée.
<i>Anémone silvestris</i> L.	Anémone sauvage.
<i>Anémone trifolia</i> L.	Anémone trifoliée.
<i>Angelica heterocarpa</i> Lloyd.	Angélique à fruits variés.
<i>Anthyllis barba-jovis</i> L.	Arbuste d'argent, Barbe de Jupiter.
<i>Apium repens</i> (Jacq) Lag.	Ache rampante.
<i>Aquilegia alpina</i> L.	Ancolie des Alpes.
<i>Aquilegia bertolonii</i> Schott.	Ancolie de Bertoloni.
<i>Aquilegia viscosa</i> Gouan.	Ancolie des Causses.
<i>Arenaria controversa</i> Boiss.	Sabline des Chaumes.
<i>Arenaria provincialis</i> Chater et Halliday.	Sabline de Provence.
<i>Armeria elongata</i> L.	Armeria à tige allongée.
<i>Armeria filicaulis belgenciensis</i> Boiss.	Armeria de Belgentier.
<i>Armeria maritima micella</i> (Miller) Willd.	Œillet marin, Gazon d'Espagne.
<i>Armeria pubinervis</i> Boiss.	Armeria à nervures poilues.
<i>Armeria pungens</i> (Link) Hoffmans. et Link.	Armeria piquant.
<i>Armeria ruscinonensis</i> Girard.	Armeria du Roussillon.
<i>Armeria soleirolii</i> (Duby) Godron.	Armeria de Soleirol.
<i>Artemisia insipida</i> Vill.	Armoise insipide.
<i>Asperula hexaphylla</i> All.	Asperule à feuille par six.

<i>Asperula occidentalis</i> Rouy.	Asperule occidentale.
<i>Asperula taurina</i> L.	Grande Croisette.
<i>Aster amellus</i> L.	Marguerite de la Saint-Michel.
<i>Aster pyrenaeus</i> Desf. ex DC.	Aster des Pyrénées.
<i>Astragalus alopecuroides</i> L.	Queue de renard d'Espagne.
<i>Astragalus bayonnensis</i> Loisel.	Astragale de Bayonne.
<i>Astragalus centralpinus</i> Br.-Bl.	Queue de renard des Alpes.
<i>Astragalus leontinus</i> Wulfen.	Astragale de Lenzbourg.
<i>Astragalus massiliensis</i> (Miller) Lamarck.	Astragale de Marseille.
<i>Atractylis cancellata</i> L.	Atractyle grillagé.
<i>Atriplex longipes</i> Drejer.	Arroche à long pédoncule.
<i>Bartsia spicat</i> Ramond.	Bartsie en épi.
<i>Berardia subacaulis</i> Vill.	Chardon de Bérard, Berarda.
<i>Betula nana</i> L.	Bouleau nain.
<i>Biscutella neustriaca</i> Bonnet.	Lunetière de Neustrie.
<i>Brassica insularis</i> Moris.	Choux de Corse.
<i>Buglossoides-gastonii</i> (Bentham) I. M. Johnston.	Gremil du Béarn, G. de Gaston.
<i>Campanula cervicaria</i> L.	Cervicaire.
<i>Cardamine chelidonia</i> L.	Cardamine fausse Chelidoine.
<i>Centaurea corymbosa</i> Pourret.	Centaurée en corymbe, C. de la Clape.
<i>Centaurea pseudocoerulescens</i> Briquet.	Fausse centaurée bleuâtre.
<i>Centaurium chloodes</i> (Brot.) Sampaio.	Petite centaurée à fleurs serrées.
<i>Centaurium scilloides</i> (L. Fil) Sampaio.	Petite centaurée à fleurs de scille.
<i>Centranthus trinervis</i> (Viv.) Beguinot.	Centranthe à trois nervures.
<i>Cephalaria syriaca</i> (L.) Roem et Schultes.	Cephalaire de Syrie.
<i>Cerintho glabra tenuiflora</i> (Bertol.) Domac.	Melinet des Alpes.
<i>Chamaecytisus glaber</i> (L. fil.) Rothmal.	Cytise à longues grappes.
<i>Cirsium montanum</i> (Waldst et Kit. ex Willd) Sprengel.	Cirse des montagnes.
<i>Cistus populifolius</i> L.	Ciste à feuilles de peuplier.
<i>Cistus pouzolzii</i> Delile.	Ciste de Pouzolz.
<i>Cistus psilocephalus</i> Sweet.	Ciste hérissé.
<i>Cochlearia aestuaria</i> (Lloyd) Heywood.	Cranson des estuaires.
<i>Cortusa matthiolii</i> L.	Cortuse de Matthioli.
<i>Crambe maritima</i> L.	Choux marin.
<i>Crepis rhaetica</i> Hegetschw.	Crepis des Alpes rhétiques.
<i>Cytisus ardoinoi</i> E. Fourn.	Cytise d'Ardoino.
<i>Daboecia cantabrica</i> (Hudson) C. Koch.	Bruyère de Saint-Daboec.
<i>Daphne striata</i> Tratt.	Camélee strié.
<i>Daucus gadeceau</i> Rouy et Camus.	Carotte de Gadeceau.
<i>Delphinium requienii</i> DC.	Dauphinelle (Pied d'alouette) de Requier.
<i>Delphinium verdunense</i> Balbis.	Pied d'alouette de Bresse.

<i>Dianthus gallicus</i> Pers.	Œillet de France, œillet des dunes.
<i>Draba incana</i> L.	Drave blanchâtre.
<i>Dracocephalum austriacum</i> L.	Dracocéphale d'Autriche.
<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.	Dracocéphale de Ruysch.
<i>Echinopartum horridum</i> (Vahl) Rothm.	Genêt très épineux.
<i>Elatine brochonii</i> Clavaud.	Elatine de Brochon.
<i>Erica erigena</i> R. Ross.	Bruyère de la Méditerranée.
<i>Erica lusitanica</i> Rudolphi.	Bruyère du Portugal.
<i>Erinacea anthyllis</i> Lmk.	Cytise hérisson.
<i>Erodium manescavin</i> Cosson.	Erodium (Bec de grue) de Manescot.
<i>Erodium rodiei</i> (Br.-Bl.) Poirion.	E. de Radié.
<i>Eryngium alpinum</i> L.	Panicaut des Alpes, Etoile des Alpes.
<i>Eryngium barrelieri</i> Boiss.	Panicaut nain de Barrelier.
<i>Eryngium spina-alba</i> Vill.	Panicaut blanc des Alpes, chardon-blanc.
<i>Eryngium viviparum</i> Gay.	Panicaut nain vivipare.
<i>Euphorbia graminifolia</i> Vill.	Euphorbe à feuilles de graminées.
<i>Euphorbia valliniana</i> Belli.	E. de Vallini.
<i>Evax carpetana</i> Lange.	Evax de Cavanillès.
<i>Evax rotundata</i> Moris.	Evax de Corse.
<i>Galoium trifidum</i> L.	Gaillet trifide.
<i>Garidella nigellastrum</i> L.	Garidelle fausse-nigelle.
<i>Gentiana ligustica</i> R. de Vilm. & Chopinet.	Gentiane ligure.
<i>Gentiana utriculosa</i> L.	Gentianelle à calice renflé.
<i>Gentianella amarella</i> Börner.	Gentianelle amère.
<i>Gentianella uliginosa</i> Börner.	Gentianelle des marais.
<i>Geranium argenteum</i> L.	Géranium à feuilles argentées.
<i>Geranium cinereum</i> Cav.	Gér. à feuilles cendrées.
<i>Geranium endressii</i> Gay.	G. d'Endress.
<i>Geum heterocarpum</i> Boiss.	Benoîte à fruits divers.
<i>Halimione pedunculata</i> Aellen.	Obione à fruit pédonculé.
<i>Hedysarum boutignyanum</i> Alleiz.	Sainfouin de Boutigny.
<i>Helianthemum lavandulaefolium</i> Miller.	Hélianthème (Fleur de soleil) à feuilles de lavande.
<i>Helianthemum mariifolium</i> (L.) Miller.	Hélianthème à feuilles de Varum.
<i>Heracleum minimum</i> Lamarck.	Berce naine.
<i>Herniaria latifolia</i> Lapeyr. ssp. <i>litardierei</i> Gamis.	Herniaire de Litardière.
<i>Heteropogon contortus</i> (L.) Beauv. ex Røem. et Schultes.	Herbe barbue, Andropogon.
<i>Hieracium eriophorum</i> Saint Amans.	Epervière des dunes.
<i>Hibiscus palustris</i> L.	Ketmie rose des marais.
<i>Iberis aurosica</i> Chaix.	Corbeille d'argent du mont Aurouse.
<i>Iberis prutii</i> Tineo ssp. <i>candolleana</i> Jordan.	Corbeille d'Argent de De Candolle.
<i>Inula bifrons</i> L.	Inule variable.

<i>Inula helenioides</i> DC.	Inule fausse-aunée.
<i>Isatis allionii</i> P.W. Ball.	Pastel des Alpes.
<i>Jurinea humilis</i> D. C.	Serratule naine.
<i>Kosteletzkya pentacarpos</i> (L.) Ledeb.	Hibiscus à cinq fruits.
<i>Laser trilobum</i> Borkh.	Laser à feuilles à trois lobes.
<i>Lavatera maritima</i> Gouan.	Lavatère maritime.
<i>Lathyrus maritimum</i> Big.	Gesse de mer.
<i>Legousia castellana</i> Sampaio.	Spéculaire de Castille.
<i>Leucanthemum crassifolium</i> (Lange) Willk.	Marguerite à feuilles épaisses.
<i>Levzea rhapontica</i> (L.) J. Holub.	Rhapontique des Alpes.
<i>Ligularia sibirica</i> Coss.	Ligulaire (Séneçon) de Sibérie.
<i>Limoniastrum monopetalum</i> (L.) Boiss.	Grand statice, Limoniastrum.
<i>Limonium cordatum</i> (L.) Mill.	Statice à feuilles cordées.
<i>Limonium dictyocladum</i> O. Kuntze.	Statice à rameaux raides.
<i>Limonium diffusum</i> O. Kuntze.	Statice diffus.
<i>Limonium girardianum</i> Fourr.	Statice de Girard.
<i>Limonium humile</i> Miller.	Petit statice.
<i>Limonium minutum</i> L. s.l.	Statice nains du groupe minutum.
<i>Limonium ramosissimum</i> (Poiret) Mair. ssp. <i>provinciale</i> Pignatti.	Statice de Provence.
<i>Limonium salmonis</i> Pign.	Statice de Salmon.
<i>Linaria commutata</i> Bernh. ex Reichenb.	Linaire grecque.
<i>Linaria cirrhosa</i> (L) Cav.	Linaire à vrilles.
<i>Linaria flava</i> (Poiret) Desf.	Linaire jaunâtre.
<i>Linaria reflexa</i> (L.) Desf.	Linaire à fruit recourbé.
<i>Linaria thymifolia</i> (Wahl) DC.	Linaire à feuilles de thym.
<i>Lindernia procumbens</i> (Krocker) Philcox	Lindernie couchée.
<i>Linnaea borealis</i> L.	Linnée boréale.
<i>Lithodora prostrata</i> (Loisel.) Griseb.	Grémil à rameaux étalés.
<i>Littorella uniflora</i> (L.) Ascherson	Littorelle à une fleur.
<i>Lobelia dortmanna</i> L.	Lobelie de Dortmund.
<i>Loeflingia hispartica</i> L.	Loeflingie d'Espagne.
<i>Lysimachia ephemerum</i> L.	Lysimaque à feuilles de saule.
<i>Lysimachia thyrsoflora</i> L.	Lysimaque à fleurs à épi.
<i>Lythrum thesioides</i> Bieb.	Salicaire faux-thésion.
<i>Lythrum thymifolia</i> L.	Salicaire à feuille de thym.
<i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Sprengel.	Salicaire à trois bractées.
<i>Matthiola tricuspidata</i> R. Br.	Matthiole à fruits à trois cornes.
<i>Minuartia stricta</i> (Swartz) Hierh.	Sabline dressée.
<i>Moehringia provincialis</i> Merxmull. et Grau.	Sabline du Verdon.
<i>Moehringia le-brunii</i> Merxmull.	Sabline de Le Brun.
<i>Morisia monanthos</i> (Viv.) Ascherson.	Morisie.

<i>Myosotis pusilla</i> Loisel.	Myosotis ténu.
<i>Nananthea perpusilla</i> DC.	Nananthée de Corse.
<i>Naufraga balearica</i> Constance & Cannon.	Naufraga des Baléares.
<i>Nigella gallica</i> Jordan.	Nigelle de France.
<i>Nonnea pulla</i> DC.	Nonnée brune.
<i>Oenanthe foucaudi</i> Tisseron.	Oénanthe de Foucaud.
<i>Odontites jaubertiana</i> De Dietr. ex Walpers.	Euphraise de Jaubert (et E. des Cévennes).
<i>Omphalodes littoralis</i> Lehm.	Cynoglosse des dunes.
<i>Pedicularis recutita</i> L.	Pediculaire tronquée.
<i>Phyllodoce coerulea</i> (L.) Bab.	Andromède bleue, Phyllodoce bleue.
<i>Physospermum cornubiense</i> (L.) DC.	Physospermum de Cornouailles.
<i>Phyteuma villarsii</i> R. Schultes.	Raiponce de Villars.
<i>Pimpinella siifolia</i> Leresche.	Pimpinelle à feuilles de Sium.
<i>Polygonum rayi</i> Bab.	Renouée de Ray.
<i>Potentilla delphinensis</i> Gren. & Godron.	Potentille du Dauphiné.
<i>Potentilla fruticosa</i> L.	Potentille arbustive.
<i>Primula allionii</i> Loisel.	Primevère d'Allioni.
<i>Primula auricula</i> L.	Oreille d'ours.
<i>Primula halleri</i> J.F. Gmelin.	Primevère de Haller.
<i>Primula marginata</i> Curtis.	Primevère marginée.
<i>Primula pedemontana</i> Gaudin.	Primevère du Piémont.
<i>Prunus lusitanica</i> L.	Prunier du Portugal.
<i>Pseudorhiza pumila</i> (L.) Grande.	Fausse-Girouille des sables.
<i>Ptilotrichum macrocarpum</i> (DC.) Boiss.	Corbeille d'argent à gros fruits.
<i>Ptilotrichum pyrenaicum</i> Boiss.	Corbeille d'argent des Pyrénées.
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	Herbe de Saint-Roch.
<i>Pulsatilla halleri</i> Willd.	Anémone (puslatille) de Haller.
<i>Pyrola rotundifolia</i> L. ssp. <i>maritima</i> (Kenyon) E.F. Warburg.	Pyrole des dunes.
<i>Quercus crenata</i> Lamarck.	Faux chêne-liège.
<i>Ranunculus canuti</i> Cosson.	Bouton d'or de Canut.
<i>Ranunculus fontanus</i> C. Presl.	Renoncule des fontaines.
<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC.	Renoncule à fleurs latérales.
<i>Ranunculus lingua</i> L.	Grande Douve.
<i>Ranunculus millefoliatus</i> Vahl.	Bouton d'or à mille feuilles.
<i>Ranunculus nodiflorus</i> L.	Renoncule à fleurs en boules.
<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill.	Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse.
<i>Ranunculus revelieri</i> Boreau.	Renoncule de Revelier.
<i>Reutera lutea</i> Boiss.	Pimpinelle jaune.
<i>Rhododendron hirsutum</i> L.	Rhododendron poilu.
<i>Rouya polygama</i> Coincy.	Thapsie de Rouy.
<i>Rumex rupestris</i> Le Gall.	Oseille des rochers.

<i>Rumex tuberosus</i> L.	Oseille tubéreuse.
<i>Salix breviserrata</i> B. Flod.	Saule à feuilles de myrte.
<i>Salix lapponum</i> L.	Saule des Lapons.
<i>Saponaria bellidifolia</i> Sm.	Saponaire à feuilles de pâquerette.
<i>Saponaria lutea</i> L.	Saponaire jaune.
<i>Saxifraga florulenta</i> Moretti.	Saxifrage à nombreuses fleurs.
<i>Saxifraga hieraciifolia</i> Walds. et Kit.	Saxifrage à feuille d'épervière.
<i>Saxifraga hirculus</i> L.	Saxifrage œil de bouc.
<i>Saxifraga muscoides</i> All.	Saxifrage fausse-mousse.
<i>Saxifraga mutata</i> L.	Saxifrage variable.
<i>Saxifraga valdensis</i> DC.	Saxifrage de Vaud.
<i>Scandicum stellatum</i> Thellung.	Scandix étoilé.
<i>Scorzonera parviflora</i> Jacq.	Scorzonère à petites fleurs.
<i>Scrophularia pyrenaica</i> Benth.	Scrofulaire des Pyrénées.
<i>Sedum andegavense</i> Desv.	Vermiculaire d'Angers.
<i>Senecio bayonnensis</i> Boiss.	Séneçon de Bayonne.
<i>Senecio congestus</i> (R. Br.) DC.	Cinénaire des marais.
<i>Senecio macrochaetus</i> Wilk.	Séneçon à grosses soies.
<i>Serratula lycopiifolia</i> A. Kerner.	Serratule à feuilles de chanvre d'eau.
<i>Seseli boconii</i> Guss.	Seseli de Bocone.
<i>Silene coeli-rosa</i> (L.) Godron.	Silène d'un rose céleste.
<i>Silene salzmanii</i> Badaro ex Moretti.	Silène de Salzmann.
<i>Silene velutina</i> Pourret ex Loisel.	Silène velouté.
<i>Sisymbrium supinum</i> L.	Sisymbre couché.
<i>Soldanella villosa</i> Darracq.	Grande Soldanelle.
<i>Sorbus latifolia</i> Persoon.	Alisier de Fontainebleau.
<i>Stachys brachyclada</i> De Noë ex Cosson.	Epiaire à rameaux courts.
<i>Stachys ocymastrum</i> (L.) Briquet.	Epiaire hérissée.
<i>Suckowia balearica</i> (L.) Medic.	Suckowia.
<i>Tamarix africana</i> Poir.	Tamaris d'Afrique.
<i>Teline linifolia</i> (L.) Webb. et Berthelot.	Genêt à feuilles de lin.
<i>Teucrium asistatum</i> Perez Lara.	Germandrée de Crau.
<i>Teucrium fruticans</i> L.	Germandrée arbustive.
<i>Teucrium massiliense</i> L.	Germandrée de Marseille.
<i>Teucrium pseudochamaepitys</i> L.	Germandrée à allure de pin.
<i>Thorella verticillinundata</i> (Thore) Briquet.	Thorella, Faux-Cresson de Thore.
<i>Trientalis europaea</i> L.	Trientale.
<i>Trifolium cernuum</i> Brot.	Trèfle à fleurs penchées.
<i>Trifolium saxatile</i> All.	Trèfle des rochers.
<i>Thymelaea tartonraira</i> (L.) All.	Tartonraire.
<i>Thymelaea thomasii</i> Duby.	Passerine de Thomas.

<i>Thymelaea ruizii</i> Loscos ex Casav.	Passerine de Ruiz.
<i>Utricularia ochroleuca</i> R. Hartmann.	Utriculaire d'un vert jaunâtre.
<i>Vicia altissima</i> Desf.	Vesce élevée.
<i>Vicia argentea</i> Lapeyr.	Vesce argentée.
<i>Vicia barbazitae</i> Ten. ex Guss.	Vesce de Barbazita.
<i>Viola arborescens</i> L.	Violette sous-arbustive.
<i>Viola cryana</i> Gillot.	Violette de Cry.
<i>Viola elatior</i> Fries.	Violette élevée.
<i>Viola pinnata</i> L.	Violette à feuilles pennées.
<i>Viola rothomagensis</i> Lamarck.	Pensée de Rouen.
<i>Vitis vinifera</i> L. ssp. <i>sylvestris</i> (C.C. Gmelin) Hegi.	Lambrusque, vigne sauvage.
<i>Xatartia scabra</i> (Lapeyr.) Meissn.	Xataria, Givert des isards.
Monocotylédones	
<i>Agrostis tenerrima</i> Trin.	Agrostis élégant.
<i>Allium chamaemoly</i> L.	Ail petit Moly.
<i>Allium lineare</i> Schrader.	Ail dressé.
<i>Allium moly</i> L.	Ail doré.
<i>Althenia barrandonii</i> Duval-Jouve.	Althenie.
<i>Ambrosinia bassii</i> L.	Ambrosinia de Bassi.
<i>Ampelodesmos mauretanica</i> (Poiret) T. Durand et Shinz.	Diss.
<i>Bellevalia romana</i> (L.) Reichenb.	Bellevalia de Rome.
<i>Bellevalia trifoliata</i> (Ten.) Kunth.	Bellevalia à trois feuilles.
<i>Borderea pyrenaica</i> Miegéville.	Dioscorée des Pyrénées.
<i>Bromus bromoideus</i> (Lej. Crepin).	Brome des Ardennes.
<i>Bromus grossus</i> Desf. ex DC.	Brome à fleurs nombreuses.
<i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl.	Alisma (Fluteau) à feuilles de Parnassie.
<i>Calla palustris</i> L.	Arum d'eau, Choucelle.
<i>Carex atrofusca</i> Schkuhr.	Laïche noirâtre.
<i>Carex bicolor</i> All.	Laïche bicolore.
<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb.	Laïche de Buxbaum.
<i>Carex chordorrhiza</i> L. fil.	Laïche à long rhizome.
<i>Carex firma</i> Host.	Laïche rigide.
<i>Carex fritschii</i> Waisb.	Laïche de Fritsch.
<i>Carex glacialis</i> Mackensie.	Laïche des glaciers.
<i>Carex grioletii</i> Roemer.	Laïche de Griolet.
<i>Carex heleonastes</i> L. fil.	Etoile des marais.
<i>Carex hordeistichos</i> Vill.	Laïche à épis d'orge.
<i>Carex irrigua</i> Hiitonen.	Laïche inondable des tourbières.
<i>Carex limosa</i> L.	Laïche des tourbières, Laïche des vases.
<i>Carex migroglochis</i> Wahlenb.	Laïche à petite arête.
<i>Carex ornithopodioides</i> Hausm.	Laïche faux-pied d'oiseau.

<i>Carex pseudobrizoides</i> Clavaud.	Laïche fausse-brize.
<i>Carex reichenbachii</i> Bonnet.	Laïche de Reichenbach.
<i>Carex repens</i> Bellardi.	Laïche rampante.
<i>Carex vaginata</i> Tausch.	Laïche à feuille engainante.
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Palmier nain, Doum.
<i>Colchicum corsicum</i> Baker.	Colchique de Corse.
<i>Colchicum cupanii</i> Guss.	Colchique de Bertoloni.
<i>Coleanthus subtilis</i> Seidl.	Coléanthe délicat.
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Sabot de Vénus.
<i>Damasonium alisma</i> Miller.	Etoile d'eau.
<i>Damasonium polyspermum</i> Cosson.	Etoile d'eau à nombreuses graines.
<i>Elymus arenarius</i> Hochts.	Seigle de mer, Grand Oyat.
<i>Epipogon aphyllum</i> Swartz.	Epipogon sans feuilles.
<i>Eriophorum gracile</i> Koch ex Roth.	Linaigrette grèle.
<i>Fritillaria orientalis</i> Adans in Web. fil. ex Mohr.	Fritillaire de Caussols.
<i>Gagea arvensis</i> (Pers.) Dumort.	Gagée des champs.
<i>Gagea bohemica</i> (Zauscher) Schultes.	Gagée de Bohème.
<i>Gagea foliosa</i> (J. et C. Presl.) Schultes.	Gagée très feuillue.
<i>Gagea granatelli</i> (Parl.) Parl.	Gagée de Granatelli.
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker-Gawler.	Gagée jaune.
<i>Gagea minima</i> (L.) Ker-Gawler.	Petite gagée.
<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort.	Gagée des prés.
<i>Gagea saxatilis</i> (Mert. et Koch) Schultes.	Gagée des rochers.
<i>Gagea soleirolii</i> F.W. Schultz.	Gagée de Soleirol.
<i>Gagea spathacea</i> (Hayne) Salisb.	Gagée à spathe.
<i>Gladiolus dubius</i> Guss.	Glaïeul douteux.
<i>Gladioius palustris</i> Gaudin.	Glaïeul des marais.
<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) O. Kuntze.	Malaxis des tourbières.
<i>Hermodactylus tuberosus</i> Miller.	Iris tubéreux.
<i>Hierochloe odorats</i> (L.) Beauv.	Avoine odorante.
<i>Iris aphylla</i> L.	Iris sans feuilles.
<i>Iris sibirica</i> L.	Iris de Sibérie.
<i>Iris sisyrhynchium</i> L.	Iris faux-Sisyrhynque.
<i>Iris xiphium</i> L.	Iris d'Espagne.
<i>Juncus pyrenaicus</i> Timb. Lagr. et Jamberrat.	Jonc des Pyrénées.
<i>Leucojum aestivum</i> L.	Nivéole d'été.
<i>Leucojum longifolium</i> Gren.	Nivéole à longues feuilles.
<i>Leucojum nicaeense</i> Ardoino.	Nivéole de Nice.
<i>Liparis loeselii</i> L.C.M. Richard.	Liparis de-Loesel.
<i>Lotium parabolicum</i> Sennen ex Sampaio.	Ivraie du Portugal.
<i>Luronium natans</i> (L.) Raf.	Flûteau nageant.

<i>Merendera filifolia</i> Camb.	Mérendère à feuilles filiformes.
<i>Narcissus triandrus</i> L. ssp. <i>capax</i> (Salis b.) L. A. Webb.	Narcisse des Gléan.
<i>Nectaroscordum siculum</i> Lindley.	Ail de Sicile.
<i>Ophrys aveyronensis</i> (J.J. Wood) Delforge.	Ophrys de l'Aveyron.
<i>Ophrys bertolonii</i> Moretti s.l.	Ophrys du groupe bertolonii.
<i>Ophrys bornbiflora</i> Link.	Ophrys bombyx.
<i>Ophrys speculum</i> Link.	Ophrys miroir.
<i>Ophrys tenthredinifera</i> Willd.	Ophrys à grandes fleurs.
<i>Orchis coriophora</i> L.	Orchis punaise.
<i>Orchis longicornu</i> Poiret.	Orchis à long éperon.
<i>Orchis provincialis</i> Balbis.	Orchis de Provence.
<i>Orchis provincialis</i> Balbis ssp. <i>pauciflora</i> (Ten.) Camus.	Orchis à fleurs peu nombreuses.
<i>Orchis saccata</i> Tenore.	Orchis feu.
<i>Orchis spitzelli</i> Sauter ex Koch.	Orchis de Spitzel.
<i>Peribalia minuta</i> Aschers et Graebn.	Canche naine.
<i>Piptatherum virescens</i> (Trin.) Boiss.	Millet verdâtre.
<i>Potamogeton rutilus</i> Wolfg.	Potamot rougeâtre.
<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	Scheuchzérie des tourbières.
<i>Scilla hyacinthoides</i> L.	Scille fausse-jacinthe.
<i>Scirpus pumilus</i> Vahl.	Scirpe alpin.
<i>Schoenus ferrugineus</i> L.	Chouin noirâtre.
<i>Serapias neglecta</i> De Not.	Sérapias négligé.
<i>Serapias nurrica</i> B. Corrias.	Sérapias des nuraghi.
<i>Serapias parviflora</i> Parlat.	Sérapias à petites fleurs.
<i>Spiranthes aestivalis</i> L. C. M. Richard.	Spiranthe d'été.
<i>Stenbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit.	Stenbergie à fleurs de colchique.
<i>Tofieldia pusilla</i> Pers.	Tofieldie boréale.
<i>Trigochin laxiflorum</i> Guss.	Troscart à fleurs lâches.
<i>Tulipa agenensis</i> DC.	Tulipe œil de soleil.
<i>Tulipa clusiana</i> DC.	Tulipe de l'Ecluse.
<i>Tulipa gesneriana</i> L.	Tulipes de Gesner.
<i>Tulipa praecox</i> Ten.	Tulipe précoce.
<i>Tulipa sylvestris</i> L. ssp. <i>sylvestris</i> .	Tulipe sauvage, sous-espèce type.
<i>Typha minima</i> Funk.	Petite massette.
<i>Typha shuttleworthii</i> Koch et Sonder.	Massette de Shuttleworth.
<i>Urginea fugax</i> Steinh.	Scille éphémère.
<i>Urginea undulata</i> Steinh.	Scille à feuilles ondulées.
<i>Veratrum nigrum</i> L.	Vérâtre noir.
Gymnospermes	
<i>Pinus mugho</i> Turra.	Pin Mugho (spontané).

Ptéridophytes	
<i>Asplenium cuneifolium</i> Viv.	Doradille à feuilles en coin.
<i>Asplenium fissum</i> Kit et Willd.	Doradille du Mercantour.
<i>Asplenium jahandiezii</i> Rouy.	Doradille du Verdon, D. de Jahandier.
<i>Asplenium lepidum</i> C. Presl.	Doradille pulvérulente.
<i>Asplenium seelosii</i> Leybold.	Doradille de Seelos.
<i>Botrychium lanceolatum</i> Angstrom.	Botrychium à feuilles lancéolées.
<i>Botrychium rnatricariaefolium</i> A. Braun ex Koch.	B. à feuilles de Matricaire.
<i>Botrychium multifidum</i> Ruprecht.	B. à feuilles multifides.
<i>Botrychium simplex</i> E. Hitchc.	Petit Botrychium.
<i>Cheilanthes catanensis</i> H.P. Fuchs.	Doradille laineuse, Notochlaena.
<i>Cystopteris diaphana</i> (Bory) Blasdel.	Cystoptéris diaphane.
<i>Cystopteris montana</i> Desv.	Cystopteris des montagnes.
<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub.	Lycopode des Alpes.
<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub. s.l.	Lycopodes aplatis du groupe <i>complanatum</i> .
<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub.	Lycopode petit-cyprès.
<i>Dryopteris aemula</i> O. Kuntze.	Polystic atlantique.
<i>Dryopteris cristata</i> A. Gray.	Polystic à crêtes.
<i>Dryopteris pallida</i> (Bory) Maire et Petitmengin.	Dryoptéris pâissante.
<i>Dryopteris tyrrhena</i> Fraser-Jenkins.	Dryoptéris tyrrhénienne.
<i>Hymenophyllum tunbridgense</i> Sm.	Hymenophyllum de Tonbridge.
<i>Hymenophyllum wilsonii</i> Hooker.	H. de Wilson.
<i>Isoetes boryana</i> Durieu.	Isoète de Bory.
<i>Isoetes durieui</i> Bory.	Isoète de Durieu.
<i>Isoetes echinospora</i> Durieu.	Isoète à spores spinuleuses.
<i>Isoetes hystrix</i> Bory.	Isoète épineux.
<i>Isoetes lacustris</i> L.	Isoète des lacs.
<i>Isoetes setacea</i> Lam.	Isoète grêle.
<i>Isoetes velata</i> A. Braun.	Isoète voilé.
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) C. Börner.	Lycopode des tourbières.
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	Fougère d'eau à quatre feuilles.
<i>Marsilea strigosa</i> Willd.	Fougère d'eau à quatre feuilles.
<i>Matteucia struthiopteris</i> (L.) Todaro.	Matteucie.
<i>Ophioglossum azoricum</i> C. Presl.	Ophioglosse des Açores.
<i>Pilularia globulifera</i> L.	Boulettes d'eau.
<i>Pilularia minuta</i> Durieu ex A. Braun.	Pilulaire délicate.
<i>Polystichum braunii</i> Fée.	Polystic de Braun.
<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	Salvinia nageante.
<i>Scleropendrium hemionitis</i> Swartz.	Herbe à la Mule.
<i>Stenogramma pozol</i> Iwatsuki.	Polypode d'Afrique.
<i>Trichomanes speciosum</i> Willd.	Trichornanes remarquable.

<i>Woodsia ilvensis</i> R. Br.	Woodsie d'Elbe.
<i>Woodwardia radicans</i> Sm.	Woodwardia.
Charophycées	
<i>Tolypella salina</i> R. Cor.	Tolypelle saline.
Bryophytes	
<i>Bruchia vogesiaca</i> Nestl. Ex Schwägr.	Bruchie des Vosges.
<i>Buxbaumia viridis</i> (DC.) Moug. & Nestl.	Buxbaumie verte.
<i>Dichelyma capillaceum</i> (Dicks.) Myr.	Fontinale chevelue.
<i>Dicranum viride</i> (Sull. & Lesq.) Lindb.	Dicrane vert.
<i>Hamatocaulis vernicosus</i> (Mitt.) Hedenäs.	Hypne vernissé.
<i>Mannia triandra</i> (Scop.) Grolle.	Grimaldie rupestre.
<i>Meesia longiseta</i> Hedw.	Meesie à longue soie.
<i>Orthotricum rogeri</i> Brid.	Orthotric de Roger.
<i>Pyramidula tetragona</i> (Brid.) Brid.	Pyramidule tétragone.
<i>Riccia breidleri</i> Jur. Ex Steph.	Riccie de Breidler.
<i>Riella helicophylla</i> (Bory & Mont.) Mont.	Riella à thalle hélicoïde.
<i>Riella notarisi</i> (Mont.) Mont.	
<i>Riella parisii</i> Gottsche.	
<i>Sphagnum pylaesii</i> Brid.	Sphaigne de la Pylaie.

Annexe II

▶ Modifié par Arrêté du 31 août 1995 - art. 5

▶ Modifié par Arrêté du 31 août 1995 - art. 7

Dicotylédones	
<i>Adonis vernalis</i> L.	Grand œil de bœuf, Adonis printanier.
<i>Centaureum capitatum</i> Melderis.	Petite centaurée à fleur en tête.
<i>Ceratonia siliqua</i> L.	Caroubier.
<i>Delphinium staphysagria</i> L.	Staphysaigre, Herbe aux poux.
<i>Dianthus superbus</i> L.	Œillet magnifique.
<i>Drosera anglica</i> Hudson.	Rosolis à feuilles longues.
<i>Drosera intermedia</i> Hayne.	Rosolis intermédiaire.
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	Rosolis à feuilles rondes.
<i>Euphorbia peplis</i> L.	Euphorbe Peplis.
<i>Gratiola officinalis</i> L.	Gratiolle officinale.
<i>Helichrysum arenarium</i> Moench.	Immortelle des sables.
<i>Helleborus niger</i> L.	Rose de Noël.
<i>Myosotis soleirolii</i> Godr.	Myosotis de Soleirol.
<i>Nerium oleander</i> L.	Laurier-rose.
<i>Paeonia mascula</i> (L.) Miller.	Pivoine mâle.
<i>Paeonia officinalis</i> L.	Pivoine officinale.
<i>Polemonium coeruleum</i> L.	Valériane grecque.
<i>Ranunculus macrophyllus</i> Desf.	Bouton d'or à grandes feuilles.

<i>Rosa gallica</i> L.	Rose de France.
<i>Salix helvetica</i> Vill.	Saule de Suisse.
<i>Senecio rutheniensis</i> Maz. Timb.	Séneçon du Rouergue.
<i>Valeriana celtica</i> L.	Nard celtique.
<i>Viola curtisii</i> E. Forst.	Pensée de Curtis.
<i>Vitex agnus-castus</i> L.	Gattilier.
Monocotylédones	
<i>Alisma graminifolia</i> Ehrh.	Fluteau à feuilles de graminées.
<i>Asphodelus arrondeau</i> Lloyd.	Bâton blanc d'Arrondeau.
<i>Urginea maritima</i> Baker.	Squille, Scille maritime.